

关于

(CT 扫描) (泛影葡胺肠道准备)

CT Scan (Gastrografin Preparation) - Chinese Mandarin



医生推荐您进行 CT 扫描。CT 扫描在影像科进行（也称为放射科或 X 射线科）。

什么是 CT 扫描？

CT 代表电脑断层扫描。

CT 扫描是利用 X 射线拍摄身体的一系列照片。这些照片可显示您身体的横切面或切片影像。由计算机组合起来，我们可以在屏幕上进行查看。扫描可显示您身体内部非常详细的图像。

放射科医师将执行扫描操作。

影像团队

影像团队组成成员包括：

- 接待人、
- 医疗支持人员、
- 护士
- 执行扫描的放射科技师
- 报告扫描的放射科医生

CT 扫描充分准备前需要做什么特殊准备吗？

我们已经给您一瓶泛影葡胺（一种轻泻药），用于清理您的肠道。

做 CT 扫描半小时前，将泛影葡胺与 500 毫升水或果汁混合，然后服下。

当您到达科室时，我们会给您更多的泛影葡胺。

不要服用任何其他泻药。

如果我是糖尿病患者，正服用药片或药物，我应该停药吗？

不需要，如果您正在服用处方药，您应该继续服用。

在我进行扫描之前，有什么需要告诉工作人员的？

如果您认为您可能已经怀孕，请告诉我们。

在所有情况下，请告诉我们您是否患有哮喘、任何过敏症、或者在过去进行 X 射线或扫描时注射后是否出现过任何问题。

我要穿戴什么？

根据要检查的身体部位，我们可能会要求您脱下部分衣服并穿上检查服。如果是这样，请于扫描前在小隔间中更换。当您达到时我们会通知您。

如果您可以穿宽松的衣服，没有像拉链、按扣、钩眼扣一类的金属紧固件。您就无需更换病号服。

从小隔间移动到扫描区时，您可以在检查病号服外面套上一件家居服。

扫描包括哪些项目？

扫描仪就像一个大型的甜甜圈，与其他一些扫描仪不同，CT 扫描仪不是封闭的。您所做的就是躺在检查台上。检查台可以通过一个大的圆形开口来前后移动，以便可以拍摄身体不同部位的照片。

这有助于医生诊断病情或决定进一步的检查和调查。

我需要接受注射吗？

有些患者可能需要在手臂进行静脉注射。这是 X 射线造影剂（无色染料）。这使得放射科医生（专科医生）能够更清楚地看到人体内的器官和血管。

如果您需要注射造影剂，放射科技师会在检查时向您解释这一点。

扫描需要多长时间？

这取决于您身体的哪部分将被扫描，通常需要 10 到 20 分钟。但是，您应该计划在科室呆一个多小时的时间。

尽管我们会尽一切努力按预约时间为您检查，但可能由于急诊病人而发生延误。如果是这样，我们会通知您。

有什么风险？

与 X 射线一样，CT 扫描也使用放射线。由于辐射水平非常小，所以通常认为扫描的好处远超过了任何风险。

我可以带陪同人员吗？

你可以带一位朋友或亲戚来，但我们不会让他们进入扫描室。请注意，我们可以让他们在主接待区等候。

如果您需要带孩子，请确保有成人陪同，因为我们无法提供托儿设施。

扫描后

在大多数情况下，一旦扫描结束，您就可以回家了。如果您接受了注射，我们可能会要求您再等待 10 分钟，然后再离开科室。这是为了确保您没有任何问题，并且没有任何注射过敏反应的迹象。

您可以像平常一样饮食，并在扫描结束后立即开始您的日常活动。

如果你正在哺乳期并接受过注射，我们建议您不要在 24 小时内进行母乳喂养。

我何时可以知道检查结果？

我们会将结果发送给推荐您进行检查的人员。您的推荐人会安排并告诉您结果。

还有其他问题吗？

请向影像部门的团队成员进行咨询。

您的预约

请

- 不要带任何贵重物品
- 如果您需要建议，请致电我们

如果您不能按预约前来检查，请尽快致电通知我们 - 我们可以将您的预约名额转给其他人，再给您预约其他时间。

联络中心电话号码

0141 347 8379

www.nhsgg.org.uk

